


Behandlung: Myome



Myome sind gutartige Neubildungen der Gebärmuttermuskulatur. Nur äußerst selten zeigen sie bösartige Veränderungen. Abhängig von Lokalisation und Größe können sie unterschiedlichste Beschwerden verursachen. Im Vordergrund stehen dabei Blutungsstörungen, Unterleibsschmerzen und Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit der Frau.

Behandlung: Myome

In der Klinik Dr. Hartog sind die unterschiedlichsten operativen Behandlungswege möglich. In Frage kommen:

- Gebärmuttererhaltende Myomentfernung via Bauchspiegelung
- Gebärmuttererhaltende Myomentfernung via Bauchschnitt
- Myomentfernung via Gebärmutterspiegelung
- Teilentfernung der Gebärmutter mit Myomen via Bauchschnitt oder -spiegelung
- Entfernung der Gebärmutter (Hysterektomie) via Bauchschnitt oder -spiegelung

Eine neue Methode stellt die unblutige Myomembolisation dar, die wir in Zusammenarbeit mit der Radiologischen Abteilung (Leiter: PD Dr. J. Wiskirchen) des gegenüberliegenden Franziskus Hospitals anbieten.

In unserer operativen Spezialsprechstunde wird gemeinsam mit der Patientin der bestmögliche Therapieplan erarbeitet. Bei einer Bauchspiegelung beträgt der stationäre Aufenthalt in der Klinik Dr. Hartog ca. 3 - 4 Tage postoperativ, bei einem Bauchschnitt ca. 7 Tage. Die Gesamterholungszeit ist individuell unterschiedlich und beträgt 3 – 6 Wochen.